

可可病蟲害

一、可可炭疽病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin)	1.2-2 公升	900	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。
23%亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-1 公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。
250g/L亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-1 公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.2-0.4 公斤	4,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。
25.9%得克利 水基乳劑* (Tebuconazole)	0.6-1.3 公升	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前30天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	0.3-0.7 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前45天停止施藥。 2.避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。

*延伸使用藥劑