

### 三、可可粉介殼蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.9-2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
75%陶斯松 水分散性粒劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。

\*延伸使用藥劑