

# 油茶病蟲害

## 一、油茶夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.7-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1.3-3.8 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.7-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.7-2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	1-3公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前21天停止施藥。
25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	1-3公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前21天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.7 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前21天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.7 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前21天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前21天停止施藥。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前21天停止施藥。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.5-1.5 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一 次。	採收前21天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

