

六、山藥黑盲椿象

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40.8%陶斯松乳劑 (Chlorpyrifos)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，最多施藥2次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒性；中度皮膚刺激性。 3.對水生物具毒性。
2.4%第滅寧水懸劑 (Deltamethrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，最多施藥2次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂稍具危害。 3.對水生物劇毒。
50%撲滅松乳劑 (Fenitrothion)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，最多施藥2次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具口服及皮膚中等急毒性、呼吸劇毒性及眼刺激性。 3.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。
10%克凡派水懸劑 (Chlorfenapyr)	0.8-1.0 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，最多施藥2次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具口服、皮膚及呼吸中等毒性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。