

八、山 藥 薊 馬 類

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda- Cyhalothrin)	1.4-2.1 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.3-0.4 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.1-0.2 公升	8,000	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天再施藥一 次。	採收前6天停止施藥。
5.87%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.2-0.4 公升	4,000	害蟲發生時施藥一次， 必要時隔7天再施藥一 次。	採收前6天停止施藥。
10%百滅寧乳劑* (Permethrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%百滅寧 水基乳劑* (Permethrin)	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%百滅寧 可濕性粉劑* (Permethrin)	1-1.5 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑