

二十、長豇豆煤黴病

學名：*Cercospora raciborskii* (Racib.) Matsumoto et Nagaoka
(*C. vignae* Racib.)

英名：Leaf spot, Sooty blotch

病徵：

主要發生於葉片，葉片上下表面出現圓型紫色小型病斑，後期擴大為中型至大型灰褐色病斑，病斑表面產生暗綠灰色至暗褐色黴狀物，病狀嚴重會造成落葉，僅殘留頂部葉片。

傳播途徑：

病菌可在田間殘株上殘存長時間，待環境因子如氣溫、相對濕度適宜時，以分生孢子行空氣傳播感染健株。

防治方法：

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------------------------|---|
| 23%三泰隆水分散性乳劑 (Triadimenol) | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，以後每隔10—14天施藥一次，連續三次。 | 1. 苗期禁止使用。 2. 易發病地區或季節可提前於開花期前施用。 3. 採收前3天停止施藥。 |
| 24.9%待克利乳劑 (Difenoconazole) | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，以後每隔10—14天施藥一次，連續三次。 | 1. 採收前3天停止施藥。 2. 對水生物具毒性。 |
| 24.9%待克利水懸劑 (Difenoconazole) | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，以後每隔10—14天施藥一次，連續三次。 | 1. 採收前3天停止施藥。 2. 對水生物具毒性。 |