

二十五、豆科根菜類疫病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1.25-2 公升	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%亞托敏水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.25-0.4 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
250g/L亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.具口服中等毒性、呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3.對水生物具中等毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
50%達滅芬可濕性粉劑* (Dimethomorph)	0.1-0.2 公斤	4,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%達滅芬水懸劑* (Dimethomorph)	0.1-0.2 公升	4,000	發病初期開始施藥，必要時7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑