

## 二十六、豆科根菜類露菌病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1.25公升	800	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.25公斤	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
250g/L亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.具口服中等毒性、呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3.對水生物具中等毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
60.8%氟比拔克 水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	0.3-0.5 公升	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
75%鋅錳座賽胺 水分散性粒劑* (Mancozeb + Zoxamide)	0.4-0.7 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.避免與礦物油、石灰硫黃混合使用。 3.避免於開花期或高溫多濕下使用。

\*延伸使用藥劑