

### 三十一、豆薯白粉病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%白克列水分散性粒劑* (Boscalid)	0.2-0.3 公斤	2,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%撲滅寧水懸劑* (Procymidone)	0.4-0.7 公升	1,200	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
50%撲滅寧可濕性粉劑* (Procymidone)	0.4-0.7 公斤	1,200	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利水懸劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
250g/L(25%w/v)待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%待克利水分散性粒劑* (Difenoconazole)	0.4-0.7 公斤	1,200	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

\*延伸使用藥劑