

三十五、豆科乾豆類露菌病

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|-------------------------------------|----------------|---------|------------------------|---|
| 10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin) | 1.25-2 公升 | 400 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。 |
| 50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin) | 0.25-0.4 公斤 | 2,000 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。 |
| 23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin) | 0.5公升 | 2,000 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。 |
| 250g/L亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin) | 0.5公升 | 2,000 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前7天停止施藥。 2.具口服中等毒性、呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3.對水生生物具中等毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 |

*延伸使用藥劑