

四十三、大豆銹病

學名：*Phakopsora pachyrhizi* Sydow

英名：Rust

病徵：

病徵初呈淡黃褐色小點，漸變為黃褐色至暗褐色，並產生黃褐色暈，其後表皮隆起夏孢子堆，成熟後破裂，噴出粉狀之夏孢子。

傳播途徑：本病藉空氣傳播。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
80%鋅錳乃浦 可濕性粉劑 (Mancozeb)	2.5-3.0 公斤	400	播種後20至30天或花蕾萌出時開始施藥一次，以後每隔7至10天施藥一次，連續四次。	施藥時應噴射於葉片上下兩面。
80%錳乃浦 可濕性粉劑 (Maneb)	2.5-3.0 公斤	400		
75%嘉保信 可濕性粉劑 (Oxycarboxin)	0.63- 0.75公斤	1,600	播種後20至30天施藥一次，以後每隔10至14天施藥一次，約繼續施藥四次。	施藥時應噴射於葉片上下兩面。
18%賽福寧 乳劑 (Triforine)	1.3-1.6 公升	750	播種後20至30天或花蕾萌出時開始施藥一次，隔14天再施藥一次，共施藥二次。	可加「全透力」展著劑以提高藥效。
5%三泰芬 可濕性粉劑 (Triadimefon)	2公斤	600	播種後20~30天或花蕾萌出時開始施藥一次，以後每隔7至10天施藥一次，連續四次。	採收前20天停止施藥。