

五十七、葉用豌豆露菌病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑* (Mancozeb + Zoxamide)	0.4-0.7 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.避免與礦物油、石灰硫黃混合使用。 3.避免於開花期或高溫多濕下使用。
60.8%氟比拔克水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	0.3-0.5 公升	1,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑* (Copper Oxychloride + Metalaxyl-M)	0.8-1.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
18.7%達滅克敏水分散性粒劑* (Pyraclostrobin + Dimethomorph)	0.3-0.5 公斤	1,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%達滅芬水懸劑* (Dimethomorph)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%達滅芬 可濕性粉劑* (Dimethomorph)	0.2-0.3 公斤	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TACTRI