

四、豆科作物葉部薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.乾豆類除外。 2.豆菜類、葉用豌豆採收前9天停止施藥。 3.豆薯採收前3天停止施藥。
9.6%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.乾豆類除外。 2.豆菜類、葉用豌豆採收前9天停止施藥。 3.豆薯採收前3天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.乾豆類除外。 2.採收前9天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.乾豆類除外。 2.採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.乾豆類除外。 2.採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.乾豆類除外。 2.採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑