

## 十二、豆科豆菜類蚜蟲類

豆科豆菜類作物：包括大豆(毛豆)、豌豆、菜豆(敏豆、四季豆)、豇豆、萊豆、蠶豆、扁豆、翼豆等。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.3-0.4 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.5%畢芬寧 水懸劑* (Bifenthrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.豆莢採收前3天停止用藥。 2.禁止使用於豆苗。
2.8%畢芬寧乳劑* (Bifenthrin)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.豆莢採收前3天停止用藥。 2.禁止使用於豆苗。

\*延伸使用藥劑