

## 十八、豆科豆菜類毒蛾類、螟蛾類

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

毒蛾類：包括台灣黃毒蛾、小白紋毒蛾等害蟲。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.毛豆除外。 2.採收前18天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前16天停止施藥。
300g/L賽速安勃水懸劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%賽速安勃水分散性劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%二福隆可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時每 7 天施一次。	1.僅防治毒蛾類。 2.採收前21天停止施藥。 3.對蜜蜂具毒性，避免於開花時使用。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.僅防治毒蛾類。 2.豆莢採收前3天停止施藥。 3.豆苗採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.僅防治毒蛾類。 2.豆莢採收前3天停止施藥。 3.豆苗採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.僅防治毒蛾類。 2.豆莢採收前3天停止施藥。 3.豆苗採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.僅防治毒蛾類。 2.豆莢採收前3天停止施藥。 3.豆苗採收前9天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	1.0-1.2 公升	500	害蟲發生時開始施藥，每隔5至7天施藥一次。	1.僅防治毒蛾類。 2.採收前4天停止施藥。 3.不可與鹼性藥劑混用。 4.溫室栽培應避免使用。

\*延伸使用藥劑