

## 二十八、毛豆銀葉粉蝨【參照花椰菜銀葉粉蝨】

危害特徵：

除直接刺吸養液外並傳佈病毒病，成蟲及若蟲並分泌蜜露，可誘發黑煤污染植株及果莢，葉片黃化皺縮提早落葉，果莢顏色變白，豆味變淡、早熟，品質與產量影響至鉅。以初秋至春末之旱季為高峰期，溫度太高或太低都不利生育，以3~6月及9~11月為發生盛期。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
28.8%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.2-0.3 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具口服、呼吸中等毒性及中度眼刺激性。
0.5%可尼丁粒劑 (Clothianidin)	60公斤		播種後21天畦上施藥一次。施藥後全園灌水至畦面濕潤。	採收前6天停止施藥。
25%賽速安 水溶性粒劑 (Thiamethoxam)	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具中等呼吸急毒性。 3.對鳥類具中等毒性；對蜜蜂具中度到輕毒性。
20%達特南 水溶性粒劑 (Dinotefuran)	0.4-0.5 公斤	3,000	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具中等呼吸急毒性，對蜜蜂劇毒。
9.6%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
9.6%益達胺 水懸劑 (Imidacloprid)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
25%派滅淨 可濕性粉劑 (Pymetrozine)	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。