

六十一、落花生赤葉蟎（落花生紅蜘蛛）

學名：*Tetranychus cinnabarinus* (Boisduval)

英名：Carmine spider mite

危害作物：落花生

生活習性：

年發生世代數不詳，以11至1月間，即秋作落花生育後期發生密度最高。卵產於葉片，成、幼蟎均群棲於葉片凹部取食危害。

危害特徵：被害部呈現白斑，嚴重時葉片黃化枯萎而脫落。

防治方法：任選下表一種藥劑防除。為避免害蟎發生抗藥性，下表藥劑可輪流施用。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
68.1%毆蟎多乳劑 (Propargite)	0.5公升	2,000	葉蟎發生時，每隔21天施藥一次。	1.施藥時必須自側面噴射到葉背、葉面、葉柄等各部位。 2.採收前7天停止施藥。
18.5%大克蟎乳劑 (Dicofol)	2.5公升	400	如發生害蟲時每隔21天施藥一次。	施藥時必須自側面噴射到葉背、葉面、葉柄等各部位。
35%大克蟎乳劑 (Dicofol)	1.25公升	800	如發生害蟲時每隔21天施藥一次。	
42%大克蟎乳劑 (Dicofol)	1.1公升	900	如發生害蟲時每隔21天施藥一次。	
25%硫滅松乳劑 (Thiometon)	1.2公升	800	如發生害蟲時每隔21天施藥一次。	