

六十六、綠豆夜蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
14.5%因得克 水懸劑* (Indoxacarb)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前28天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.2-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
19.7%得芬諾 水懸劑* (Tebufenozide)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
20%撲滅松乳劑* (Fenitrothion)	1.3-2 公升	400	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
50%撲滅松乳劑* (Fenitrothion)	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑

TAC