

## 七十七、葉用豌豆夜蛾類、螟蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
19.7%得芬諾水懸劑* (Tebufenozide)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前7天停止施藥。
70%得芬諾可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.33公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前7天停止施藥。
43%佈飛松乳劑* (Profenofos)	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前4天停止施藥。 3.避免與石灰硫磺劑混合使用。
5%因滅汀水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。
2.15%因滅汀水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。
40%賽速安勃水分散性劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole)	0.1-0.2公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
300g/L賽速安勃水懸劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole)	0.1-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

\*延伸使用藥劑