

## 八十、黃 者 夜 蛾 類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.15-0.25 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前18天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.3-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前18天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前18天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前18天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前18天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。

TACTRI