

二、玫瑰黑斑病

學名：*Diplocarpon rosae* Wolf

英名：Black spot

病徵：

本病又稱黑點病或黑星病，危害葉片，尤以成熟葉片受害較嚴重，初呈現深紫褐色小斑，擴大呈圓形狀，中心部呈灰白色。其上面著生黑點是為柄子殼，本病在高溫多濕時發病嚴重。

傳播途徑：分生孢子是為其傳染源。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
56%貝芬硫醌 可濕性粉劑 (Carbendazim + Dithianon)	1 - 2.5 公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次。	本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1,000倍。
18.6%賽福寧乳劑 (Triforine)	1 - 2.5 公升	1,000	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次。	本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1,000倍。
75%快得保淨 可濕性粉劑 (Oxine-copper + Thiophanate- methyl)	2 - 5 公斤	500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次。	本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1,000倍。
18%貝芬寧水懸劑 (Carbendazim + Triforine)	1.7 - 4.3 公升	600	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次。	本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1,000倍。