

十二、抗 菊 露 菌 病

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-1.5 公升	800	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.1-0.3 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
35%本達樂 可濕性粉劑* (Benalaxyl)	0.2-0.6 公斤	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前28天停止施藥。 2.限花苞形成前使用。
50%達滅芬 可濕性粉劑* (Dimethomorph)	0.2-0.6 公斤	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前28天停止施藥。 2.限花苞形成前使用。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.2-0.6 公升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
18.7%達滅克敏 水分散性粒劑* (Pyraclostrobin + Dimethomorph)	0.2-0.8 公斤	1,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前28天停止施藥。 2.限花苞形成前使用。
71.6%銅右滅達樂 可濕性粉劑* (Copper Oxychloride + Metalaxyl-M)	0.5-2 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前28天停止施藥。 2.限花苞形成前使用。

*延伸使用藥劑