

二十五、唐 菖 蒲 灰 黴 病

學名：*Botrytis gladiolorum*

英名：Botrytis grey mold

病徵：

本病主要於冬末初春時發生，初期葉片產生白色之褪色小斑點後轉變成紅色，病斑部稍凹陷，中期病斑逐漸擴大，病斑顏色逐漸加深，後期轉為褐色，大小不超過 0.5公分之方形至長方形斑，嚴重時多數病斑互相癒合，造成葉片乾枯。

傳播途徑：

遇高濕度時病斑處佈滿灰色粉末狀，為病原菌之分生孢子，本病即靠分生孢子傳播。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%撲滅寧 水懸劑 (Procymidone)	0.7- 1 公升	1,500	發病初期開始，每隔7天施藥一次，連續三至五次。	本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3,000倍。
50%撲滅寧 可濕性粉劑 (Procymidone)	0.7- 1 公斤	1,500	發病初期開始，每隔7天施藥一次，連續三至五次。	本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3,000倍。
75%快得保淨 可濕性粉劑 (Oxine-copper + Thiophanate)	1.6- 2 公斤	500		
50%免克寧 水分散性粒劑 (Vinclozolin)	0.7- 1 公斤	1,500	發病初期開始每隔7天噴藥一次，連續三至五次。	本藥劑試驗時加展著劑「來看通CS-7」3,000倍。