

二十九、向日葵炭疽病

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|--|----------------|---------|------------------------|----------------|
| 27.3%三氟得克利水懸劑* (Trifloxystrobin + Tebuconazole) | 0.1-0.4 公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前7天停止施藥。 |
| 23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin) | 0.08-0.5 公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前21天停止施藥。 |
| 75%四氯異苯腈可濕性粉劑* (Chlorothalonil) | 0.4-1.7 公斤 | 600 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前7天停止施藥。 |
| 75%四氯異苯腈水分散性粒劑* (Chlorothalonil) | 0.4-1.7 公斤 | 600 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前7天停止施藥。 |
| 40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil) | 0.8-3.1 公升 | 320 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前7天停止施藥。 |
| 24.9%待克利乳劑* (Difenoconazole) | 0.08-0.3 公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前14天停止施藥。 |
| 24.9%待克利水懸劑* (Difenoconazole) | 0.08-0.3 公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前14天停止施藥。 |
| 250g/L待克利乳劑* (Difenoconazole) | 0.08-0.3 公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前14天停止施藥。 |
| 10%待克利水分散性粒劑* (Difenoconazole) | 0.2-0.8 公斤 | 1,200 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 葵花子採收前14天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑