

九、菊花蚜蟲

學名：A.棉蚜*Aphis gossypii* Glover

B.菊蚜*Macrosiphoniella sanborni* (Gillette)

英名：A. Cotton aphid, B. Chrysanthemum aphid

生活習性：

雌蟲經年行孤雌生殖，年發生數十世代，常發生於嫩葉及嫩芽，花內吸食養液，老葉棲息密度較少。乾燥季節發生密度較高。

危害特徵：使心芽萎縮及產生煤污狀物，影響品質。

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑 (Methomyl)	0.23-0.68 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	本藥劑試驗時加展著劑 Bivert 4,000倍稀釋液。
40%納乃得 水溶性粉劑 (Methomyl)	0.23-0.68 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	
25%納乃得 水溶性粉劑 (Methomyl)	0.36-1.08 公斤	900	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	
25%滅多松乳劑 (Oxydemeton- methyl)	0.6-1.2 公升	1,000		
3%加保扶粒劑 (Carbofuran)	60公斤		第一次：定植前施於 表土，攪拌後再種植 灌水。 第二次：培土前施用。	
25%福化利乳劑 (tau-Fluvalinate)	0.04- 0.08公升	15,000	發生蚜蟲時每隔7天施 藥一次。	