

十三、菊花夜蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.3-1.3 公斤	800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
5%可芬諾 水懸劑* (Chromafenozide)	0.3-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap)	0.3-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。

*延伸使用藥劑