

十五、菊花二點葉蟻、蚜蟲檢疫前處理

菊花二點葉蟻：學名、英名及危害特徵請參閱菊花葉蟻類。

菊花蚜蟲：

學名：A. 綿蚜 *Aphis gossypii* Glover

B. 桃蚜 *Myzus persicae* Sulzer

英名：A. Cotton aphid, B. Green peach aphid

生活習性：

繁殖迅速，常聚集成群。雜食性，寄主種類很多。喜聚集在菊花嫩芽、幼葉；開花期則棲息於花苞、花冠上，或喜隱匿於花瓣之間，吸食汁液危害。周年發生，但以冬季或初春發生密度較高，多雨季節較少。

防除方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
42%大克蟻乳劑 混合 2.8%第滅寧乳劑 (Dicofol + Deltamethrin)			本方法專用於外銷菊花切花處理，用藥量每100公升稀釋液中含本藥劑200公撮，2.8%第滅寧乳劑17公撮，將切花浸漬2~3秒。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本混合液不可用於白色菊花。白色菊花先以本藥劑500倍稀釋液浸漬莖葉部以消滅二點葉蟻，但不可浸及花部，再以2.8%第滅寧乳劑6000倍稀釋液浸漬全枝，切花以消滅蚜蟲，並陰乾之。 2. 田間葉蟻防治應避免使用本藥劑。