

十七、非洲菊斑潛蠅

學名：*Liriomyza trifolii* (Burgess)

英名：American serpentine leafminer

生活習性：

卵產在葉片內，老熟幼蟲自葉內鑽出，於葉面或掉落土中化蛹。成蟲晚間靜止，白日在花葉間飛翔或棲息，可活一週左右。每雌蟲一生產卵一、二百粒。春秋季節繁殖最迅速，為害嚴重時葉片上布滿幼蟲蜿蜒曲折的食痕，葉片初為灰白色繼之轉為黃褐色，影響外觀及植株生長。

防除方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2%阿巴汀乳劑 (Abamectin)	0.25-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	對蜜蜂劇毒。
2%阿巴汀水基乳劑 (Abamectin)	0.25-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	對蜜蜂劇毒。
50%培丹 水溶性粉劑 (Cartap hydrochloride)	0.4-0.8 公斤	1,000	害蟲發生時，開始施藥 ，每隔7天施藥一次。	
40%三落松乳劑 (Triazophos)	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時，開始施藥 ，每隔14天施藥一次。	
50%硫賜安 可濕性粉劑 (Thiocyclam hydrogen oxalate)	0.4-0.8 公斤	1,000	害蟲發生時，開始施藥 ，隔7天施藥一次。	
75%賽滅淨 可濕性粉劑 (Cyromazine)	0.08- 0.16 公斤	5,000	害蟲發生時，開始施藥 ，每隔7天施藥一次。	