

二十一、杭菊夜蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%芬化利水基乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
20%芬化利可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.1-0.4 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.2-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.本藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前12天停止施藥。
28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.本藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前12天停止施藥。
18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid)	0.1-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.本藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前12天停止施藥。
48.1%蘇力菌水分散性粒劑* (<i>Bacillus thuringiensis</i>)	0.1-0.3 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	本藥劑僅防治夜蛾類。
2.5%畢芬寧水懸劑* (Bifenthrin)	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.本藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前15天停止施藥。

*延伸使用藥劑