

三十、唐 菖 蒲 根 蟎

學名：*Rhizoglyphus robini* Claparede

英名：Bulb mite

生活習性：

蟎體肥圓，行動遲緩。貯藏期間的種球或是種植於土壤中的種球，均可受害。受害球莖呈黑褐色的腐敗狀態，而受害部通常有一群包括各不同齡期的根蟎個體存在。

危害特徵：

被害植株呈現營養不良的徵狀，葉片細小，生長遲緩，花梗小且花數少。嚴重被害球種植後亦有無法萌芽的現象。

防除方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
43%佈飛松乳劑 (Profenofos)	3.0-4.5 公升	4,000	唐菖蒲種球貯藏前或種植前，浸漬種球30分鐘。	具中度眼刺激性及對水生 物劇毒。
50%益滅松 可濕性粉劑 (Phosmet)		2,000	貯藏、種植前施藥。	
25%新殺蟎乳劑 (Bromopropylate)		4,000	唐菖蒲種球貯藏前或種植前，浸漬種球30分鐘。	
50%普硫松乳劑 (Prothiofos)	3-4.5 公升	1,000		
50%普硫松 水基乳劑 (Prothiofos)	3-4.5 公升	1,000		
35%白克松 可濕性粉劑 (Pyraclofos)		1,000		