

## 四十一、野薑花夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
34%硫敵克水懸劑* (Thiodicarb)	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.4-0.5 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.3-0.8 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
48.1%蘇力菌 水分散性粒劑* ( <i>Bacillus thuringiensis</i> )	0.3-0.6 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
9.6%益達胺 水懸劑* (Imidacloprid)	0.7-1.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.限開花前使用。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.7-1.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.限開花前使用。

\*延伸使用藥劑