

四十八、蓮夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.8-1.2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	蓮花採收前21天、蓮子採收前35天、蓮藕採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1.5-2.3 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	蓮花採收前21天、蓮子採收前35天、蓮藕採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.8-1.2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	蓮花採收前21天、蓮子採收前35天、蓮藕採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.8-1.2 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	蓮花採收前21天、蓮子採收前35天、蓮藕採收前6天停止施藥。
5%可芬諾 水懸劑* (Chromafenozide)	1.2-1.8 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	蓮花採收前21天、蓮子採收前14天、蓮藕採收前18天停止施藥。

*延伸使用藥劑