

五十、曇花薊馬類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
20%覆滅蟎 水溶性粉劑* (Formetanate)	2.5-6.3 公斤	600	害蟲發生時施藥一次。	採收前21天停止施藥。
2.5%賜諾殺 水懸劑* (Spinosad)	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	1.食用花卉採收前14天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免於作物開花時期使用。 3.對水生物具中等毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離之地區」。
11.6%賜諾殺 水懸劑* (Spinosad)	0.1-0.6 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	1.食用花卉採收前14天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免於作物開花時期使用。 3.對水生物具中等毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離之地區」。
80%賜諾殺 可濕性粉劑* (Spinosad)	0.02-0.08 公升	32,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	1.食用花卉採收前14天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免於作物開花時期使用。 3.對水生物具中等毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離之地區」。

*延伸使用藥劑