

五十六、向日葵夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
5%賽滅寧 微乳劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.2-0.7 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於開花期使用。

TACTRI