

五十八、觀 賞 花 卉 蚜 蟲

防治方法：藥劑使用於非委託田間試驗之其他花卉種類及品種，或於不同生長時期使用時，應先行作小面積之藥害測試。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%甲基巴拉松膠囊懸著液 (Methyl parathion)	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	1.本藥劑委託田間試驗之作物對象為菊花。 2.對蜜蜂毒性高。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
25%免扶克可濕性粉劑 (Benfuracarb)	1.0-1.2 公斤	800	蚜蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次。	限於觀賞菊花施用。
9.8%佈嘉信藥籤劑 (Butocarboxim)	1支 / 5 吋盆(約 12公分)		發現蚜蟲時，將藥籤插入根部附近土中。	限盆栽使用(限觀賞用菊花)。
20%免扶克乳劑* (Benfuracarb)	1.3-1.6 公升	600	害蟲發生時施藥，每隔7天施藥一次。	限於觀賞菊花施用。

*延伸使用藥劑

菊花蚜蟲

學名：A.棉蚜 *Aphis gossypii* Glover

B.菊蚜 *Macrosiphoniella sanborni* (Gillette)

英名：A. Cotton aphid, B. Chrysanthemum aphid

生活習性：見前。

危害特徵：見前。