

五、竹盲椿象（竹蚊、青蚊）

學名：*Mecistoscelis scirtetoides* Reuter

英名：Bamboo mirid

危害竹類：

緬甸刺竹、長枝竹、條紋長枝竹、金絲火廣竹、烏腳綠竹、蓬萊竹、紅鳳凰竹、綠竹、八芝蘭竹、長毛八芝蘭竹、烏葉竹、佛竹、金絲竹、南洋、巨竹、麻竹、美濃麻竹、馬來麻竹、印度實竹等。

生活習性：

本蟲全年均有發生，以五至十月發生密度最高，成蟲產卵數十粒排成一列於嫩葉葉面近葉尖部位，卵初產時呈乳白色，近孵化時轉變為淡紅色，若蟲及成蟲爬行葉背間，以其細長口吻刺穿葉背表皮，伸入柵狀組織取食，而成蟲及若蟲主要聚集在植株中下層枝葉上。

危害特徵：

被取食部位之葉表面出現大小不一近方形的白斑，而葉背外觀則甚完整，但經口吻穿過之組織傷口易導致銹病的發生，因此，在白斑出現後之葉背多有赤褐色銹病病斑，嚴重時全葉枯乾，竹筍產量銳減。

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
30%撲芬松乳劑 (Fenvalerate + Fenitrothion)	0.2 公升 (以 300 公升施藥量計算)	1,500	每年5月蟲害發生時每隔10~15天施藥一次，共施二至三次。	同一地區以施行共同防治效果較佳，施藥竹林不得採葉。
20%芬化利乳劑 (Fenvalerate)	0.15 公升 (以 300 公升施藥量計算)	2,000	每年5月蟲害發生時每隔10~15天施藥一次，共施二至三次。	同一地區以施行共同防治效果較佳，施藥竹林不得採葉。