

(二)果樹園雜草

1.柑桔類果園雜草：

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
30.15%嘉磷派芬草水懸劑 (Pyraflufen-ethyl + Glyphosate-isopropyl ammonium)	6公升	每公頃用水量600公升	雜草生長旺盛至開花前，均勻噴施於植株上。	1.不可噴及作物，以免發生藥害。 2.具呼吸中等毒性及中度皮膚刺激性。	馬唐、野萵、滿天星、鐵萵草、草、咸豐草、香附菜、酢醬草、藎、飛揚、牛筋仔、竹仔香。
25%伏速隆水分散性粒劑 (Flazasulfuron)	150公克	稀釋至1,000公升	雜草生育初期(草高10公分以下)，全面均勻噴施。		闊葉鴨舌節、香蓆、仔草、紫背草、咸豐草。
80%草芬定水分散性粒劑 (Azafenidin)	500公克	每公頃稀釋水量為600公升	雜草萌發前至草高約3公分以下時，全面均勻噴施。	1.雜草茂盛時，可先用41%嘉磷塞溶液噴施。 2.於山坡地使用時，以管狀或點狀噴施，不宜全面噴施。	牛筋草、馬唐草、鵝兒腸、野萵、碎米莎草、酢醬草、芥菜、草、鬼針、葉下珠。
80%草芬定水分散性粒劑 (Azafenidin) + 41%嘉磷塞(異丙胺鹽)溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium)	500公克 6公升	每公頃稀釋水量為600公升	雜草萌發後約20至30公分時，以田間立即混合方式均勻噴施於草上。	1.雜草茂盛時，先噴施。 2.於山坡地使用時，以管狀或點狀噴施，不宜全面噴施。	牛筋草、馬唐草、紫花藎、鵝兒腸、草、節節花、野萵、紫背草、鐵萵草、碎米莎草、水蜈蚣、滿天星、葉下珠、山芥菜、鬼針毛穎雀稗、酢醬草。
74.7%嘉磷塞(胺鹽)水溶性粒劑 (Glyphosate-ammonium)	2公升	600公升	雜草生長旺盛時全面噴藥。	不可噴及柑桔植株，以免發生藥害。	馬唐、霍香蓆、草、龍葵、芒稷、野萵、毛穎雀稗、鵝兒腸、牛筋草、水蜈蚣。
33%嘉磷氟氣比溶液 (Glyphosate + Fluroxypyr)	6公升	600公升	雜草生長旺盛時全面噴藥。	不可噴及柑桔植株，以免發生藥害。	馬唐、牛筋草、芒稷、白花霍香蓆、昭和草、木蟲草、野萵、菁芳草、龍葵、咸豐草、酢醬草、兔仔草、毛穎雀稗、鵝兒腸。

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
10.6%甲基合氯氣乳劑 (Haloxyp-methyl) + 29.64%氟氣比乳劑 (Fluroxypyr) (田間立即混合)	1.0 + 1.5 公升	稀釋至 600 公升	雜草生長旺盛時將藥液均勻噴施於雜草上。	1.施藥時勿噴及果樹。 2.對莎草科及莧科雜草效果較差。	兩耳草、馬唐、牛筋草、雙穗雀稗、藿香薊、竹仔菜、牽牛花。
18.02%固殺草溶液 (Glufosinate-ammonium)	5 - 10 公升	稀釋至 600公 升	雜草高20~30公分至開花初期，均勻噴施。	不可噴到柑桔樹，以免發生藥害。	馬唐、畫眉草、刺節草、珠仔草、節節花、野牽牛、野萵、牛筋草、白茅紅毛草。
40.8%嘉磷塞(三甲基硫鹽)溶液 (Glyphosate-trimesium)	5 - 7 公升	稀釋至 600公 升	雜草旺盛至開花前全面噴施。	通常施藥後5~7天即可見效。	牛筋草、白茅、藿香薊、狗芽根、毛穎雀稗。
41%嘉磷塞(異丙胺鹽)溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium)	4 - 6 公升	稀釋至 600公 升	雜草旺盛至開花前全面噴施。		牛筋草、巴拉草、白茅、藿香薊、狗牙根、毛穎雀稗、香附子。
20%畢拉草水溶性粉劑 (Bialaphos)	10公斤	100	雜草約20公分時，將藥液直接均勻噴施於雜草上。	不可噴及柑桔植株以免發生藥害。	牛筋草、鋪地黍、狗牙根、咸豐草、扛板歸、藿香薊、野牽牛等。
29.64%氟氣比乳劑 (Fluroxypyr)	1.5 公升	700	將稀釋藥液均勻噴施於雜草上。	不可噴到果樹以免發生藥害。	冷飯藤、藿香薊、扛板歸、波緣竹葉菜、破得力(假仙草)葛藤等闊葉及藤類雜草。
30.7%嘉磷二四地溶液 (Glyphosate + 2,4-D)	5公升	100	將稀釋藥液均勻噴施於雜草上。	不可噴到果樹以免發生藥害。	破得力(假仙草)加拿大蓬、冷飯藤、馬齒莧、牛筋草、毛穎雀稗、亨利馬唐等。

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
41%嘉磷塞(異丙胺鹽)溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium)	5公升	30	1.雜草生長旺盛至開花期，將藥液均勻噴施於雜草上。 2.採用低容量動力噴頭噴施之。 3.四至五月噴施一次後，雜草再生時，每隔二個月，可噴1.5公升(稀釋100倍)防除之。	1.不可噴及作物，以免發生藥害。 2.通常施藥後5~7天即可見效，但鹽水蘆竹須施藥後1個月始逐漸枯死。 3.雜草繁密或多種雜草滋生時，可使用較高藥量。	白茅、狗牙根、牛筋草、藿香薊、扛板歸、鬼針草、馬唐草等。 巴拉草、香附子、白茅、雙穗雀稗、毛穎雀稗等。 狗牙根、鋪地黍等。 鹽水蘆竹。
	4-5公升	100-120			
	5-6公升	80-100			
	6-7公升	70-80			
24%巴拉刈溶液 (Paraquat)	第1次 3.5公升 第2次 2公升	200-350			
80%達有龍水分散性粒劑 (Diuron)	2-3公斤	250-350	雨後土壤濕潤狀況下，將藥劑均勻噴施於地面。		馬唐草、毛穎雀稗、狼尾草、牛筋草、耳環草、昭和草、生毛將軍、鬼針草。
80%達有龍可濕性粉劑 (Diuron)	2-3公斤	250-350	雨後土壤濕潤狀況下，將藥劑均勻噴施於地面。		馬唐草、毛穎雀稗、狼尾草、牛筋草、耳環草、昭和草、生毛將軍、鬼針草。
80%克草可濕性粉劑 (Bromacil)	2公斤(萌前)	350	雨後土壤濕潤狀況下，將藥劑均勻噴施於地面。		牛筋草、莎草、稗草、小指草。
	3公斤(萌後)	650			
35.2%甲基砷酸鈉溶液 (MSMA)	10公升	80	雨後土壤濕潤狀況下，將藥劑均勻噴施於地面。		藿香薊、鬼針草、雷公根、薺菜、蝨母子、昭和草、黃瓜菜。
44.5%三福林乳劑 (Trifluralin)	3公升	300	雨後土壤濕潤狀況下，將藥劑均勻噴施於地面。		稗草、牛筋草。
80%克草可濕性粉劑 (Bromacil)	3公斤	650	將藥劑均勻噴施在雜草上。	1.限用於2年生以上柑桔園。 2.施藥時加展著劑。	牛筋草、大指草、小指草、稗草、莎草。

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
33.6%巴達刈水懸劑 (Paraquat + Diuron)	7公升 5公升 x2次	85-120 100	雜草幼嫩狀態(草長20公分以下)施藥。 1.雜草幼嫩狀態(草長20公分以下)施藥。 2.於第一次施藥後20天再噴一次。	不可噴及作物，以免發生藥害。	藿香薊、鬼針草、馬唐草、長花馬唐草、狗牙根。
37%亞速爛溶液 (Asulam)	15公升 7公升 x2次	50-60 100	草長約15~20公分未開花前，將藥劑均勻噴灑於雜草上。 1.草長約15~20公分未開花前，將藥劑均勻噴灑於雜草上。 2.於第一次施藥後30天再噴一次。		白茅、狗牙根、牛筋草、馬唐草、藿香薊、婆婆草。
13.5%固殺草溶液* (Glufosinate-ammonium)	3-5公升	稀釋至600公升	1.於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2.雜草密集時可使用高劑量。		

*延伸使用藥劑