

2.梨園雜草：

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
13.5%固殺草溶液 (Glufosinate-ammonium)	3公升	稀釋至600公升	雜草高20-30公分至開花初期，均勻噴施於草上。	不可噴及作物，以免發生藥害。	1.馬唐、水蜈蚣、扁穗莎草、滿天星、菁芳草、紫花霍香薊、咸豐草、龍葵。 2.具口服、皮膚及呼吸中等毒性，具嚴重眼刺激性。
41%嘉磷塞(異丙胺鹽)溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium)	4 - 5公升 5 - 6公升 6 - 7公升	100-120 80-100 70-80	1.雜草生長旺盛至開花期，將藥液均勻噴於草上。 2.雜草繁密或多種雜草滋生時，可用較高藥量。	1.不可噴及作物，以免發生藥害。 2.通常施藥後5 - 7天即可見效，但鹽水蘆竹須施藥後一個月始逐漸枯死。	巴拉草、香附子、白茅、雙穗雀稗、毛穎雀稗、大理草。 狗牙根、鋪地黍、管草、竹葉菜、大理草。 鹽水蘆竹。

TACTRI