

3.梅園雜草：

| 藥劑名稱 | 每公頃施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥時期及方法 | 注意事項 | 防除對象 |
|---|-------------|------------------|--|--|--|
| 41%嘉磷塞 (異丙胺鹽) 溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium) | 4 - 6 公升 | 稀釋至 600公 升 | 雜草生長旺盛時， 將藥液均勻噴施於 雜草上。 | 避免噴及作物。 | 牛筋草、 蒼芳草、 藿香薊、 鬼針草、 狗牙根、 升馬唐。 |
| 41%嘉磷塞 (異丙胺鹽) 溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium) | 4 - 5 公升 | 100- 120 | 1.雜草生長旺盛至 開花期將藥液均 勻噴於草上。 2.雜草繁密或多種 雜草滋生時，可 用較高藥量。 | 1.不可噴及作物， 以免發生藥害。 2.通常施藥後5~7 天即可見效，但 鹽水蘆竹須施藥 後1個月始逐漸 枯死。 | 巴拉草、 香附子 、 白茅、 大理草 、 雙穗雀稗、 毛 穎雀稗。 狗牙根、 舖地黍、 冷飯藤、 管草。 鹽水蘆竹。 |
| | 5 - 6 公升 | 80- 100 | | | |
| | 6 - 7 公升 | 70-80 | | | |