

10.鳳梨園雜草：

(1)園內雜草：

任選下表一種藥劑防除：

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
40%達有龍水懸劑(Diuron)	全面：4公升 畦間：2公升	600-800 l/ha (150-200倍)	雜草種子萌芽前，噴施土面。	1.本藥劑對成株雜草及宿根性雜草無效。 2.若與其他短期作物間作時，避免使用本藥劑。 3.砂質土壤宜略減藥量。 4.避免噴及鳳梨植株葉片及心部。	馬唐草、牛筋草、莎草、株仔草、雀稗、野甘草、水丁香、闊葉破得力、馬齒莧等。
50%草脫淨可濕性粉劑(Atrazine)	全面：4.0-6.0公斤 畦間：3.0-4.0公斤	200-500		1.砂質土壤施用低藥量，粘質土壤施用高藥量。 2.本藥劑不能殺死成長中之雜草。 3.加水倍數可增加，但不宜減少。	菊科、禾本科、莎草科等一年生雜草均有效。
80%達有龍水分散性粒劑(Diuron)	全面：2.0-3.0公斤 畦間：1.5-2.0公斤	400-500		1.砂質土壤施用低藥量，粘質土壤施用高藥量。 2.本藥劑不能殺死成長中之雜草。 3.加水倍數可增加，但不宜減少。	菊科、禾本科、莎草科等一年生雜草均有效。
80%達有龍可濕性粉劑(Diuron)	全面：2.0-3.0公斤 畦間：1.5-2.0公斤	400-500		1.砂質土壤施用低藥量，粘質土壤施用高藥量。 2.本藥劑不能殺死成長中之雜草。 3.加水倍數可增加，但不宜減少。	菊科、禾本科、莎草科等一年生雜草均有效。
17.5%伏寄普乳劑(Fluazifop-p-butyl)	1.5公升	每公頃稀釋至660公升	鳳梨定植後雜草萌芽至3~6葉(10公分以內)時施藥。		牛筋草、馬唐草、短穎馬唐、狗牙根。
60%達有淨可濕性粉劑(Diuron + Hexazinone)	全面：2公斤 畦間：1.2-1.5公斤	400-500		1.本藥劑對宿根性雜草及成長之雜草無效，宜事先拔除。 2.應在土壤濕度適宜時噴施。土壤過份乾燥時施藥效果較差或無效。 3.噴施時儘量避免噴及鳳梨新葉及蕊部	馬唐草、牛筋草、節節花、落葵、野莧、雀稗。

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
90%菲殺淨 水溶性粉劑 (Hexazinone)	全面： 0.5 公斤 畦間： 0.3 公斤	1,600- 2,000			
80%克草 可濕性粉劑 (Bromacil)	5公斤	300	將藥劑均勻噴施於雜草上。	對鳳梨植株無藥害。	茅草、鋪地黍。
13.5%固殺草 溶液* (Glufosinate-ammonium)	3-5 公升	稀釋 至600 公升	1.於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2.雜草密集時可使用高劑量。	不可噴及作物，以免發生藥害。	

*延伸使用藥劑

(2)畦畔雜草：

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
41%嘉磷塞 (異丙胺鹽) 溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium)	4 - 5 公升 5 - 6 公升 6 - 7 公升	100- 120 80- 100 70-80	1.雜草生長旺盛至開花期，將藥液均勻噴施於草上。 2.雜草繁密或多種雜草滋生時，可使用較高藥量。	1.不可噴及作物，以免發生藥害。 2.通常施藥後5~7天即可見效，但鹽水蘆竹須施藥後1個月始逐漸枯死。	巴拉草、香附子、白茅、雙穗雀稗、毛穎雀稗等。 狗牙根、鋪地黍等。 鹽水蘆竹。