

14. 葡萄園雜草：

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
10%伏速隆 可濕性粉劑 (Flazasulfuron)	750 公克	每公頃稀釋至 1,000 公升	雜草生育初期(草高10公分以下)均勻噴施。	不可噴及作物以免發生藥害。	滿天星、水蜈蚣、升馬唐、木蟲草、小葉碎米薺、鐵線草、節花路蓼、黃花酢醬草、香附子、馬齒莧、毛茛、咸豐草。
13.1%嘉磷塞 (三甲基硫鹽) 溶液 (Glyphosate-trimesium)	8公升	用水量600公升/ 公頃 (75倍)	雜草生長旺盛至開花期均勻噴施。	不可噴及作物以免發生藥害。	牛筋草、馬唐、毛穎雀稗、孟仁草、昭和草、野莧、滿天星、霍香薊、菁芳草、水蜈蚣。(對眼具微刺激性)
13.5%固殺草 溶液 (Glufosinate-ammonium)	5公升	每公頃稀釋至 600公升	雜草生長旺盛時，將藥液均勻噴施於雜草上。	不可噴及葡萄植株，以免發生藥害。	芒稷、碎米莎草、昭和草、心葉母草、通泉草、龍葵、馬齒莧。(對眼強刺激性)
41%嘉磷塞 (異丙胺鹽) 溶液 (Glyphosate-isopropyl-ammonium)	4 - 5 公升  5 - 6 公升  6 - 7 公升	100- 120  80- 100  70-80	1. 雜草旺盛至開花期，將藥劑噴施於草上。 2. 雜草繁密或多種雜草滋生時可用較高藥量。	1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 通常施藥後5~7天即可見效，但鹽水蘆竹施藥後1個月逐漸枯死。	巴拉草、香附子、白茅、雙穗雀稗、毛穎雀稗。  大理草、狗牙根、鋪地黍、管草。  鹽水蘆竹。