

# 黃金果

## 一、黃金果白粉病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
11.6%四克利水基乳劑 (Tetraconazole)	0.4-0.8 公升	2,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑* (Iminoctadine tris (Albesilate))	0.6-1.3 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
10.7%四克利乳劑* (Tetraconazole)	0.4-0.8 公升	2,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
15%得克芬胺乳劑* (Cyflufenamid + Tebuconazole)	0.5-1 公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
30%無水硫酸銅可濕性粉劑* (Copper sulfate)	0.9-2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
11.76%芬瑞莫乳劑* (Fenarimol)	0.2-0.5 公升	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
27.3%白列克收欣水懸劑* (Boscalid + Kresoxim-methyl)	0.5-1 公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

\*延伸使用藥劑