

二、黃金果粉介殼蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%三落松乳劑* (Triazophos)	0.5-1公升	1,000	害蟲發生時施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.7%賽速洛寧 膠囊水懸混劑* (lambda- Cyhalothrin + Thiamethoxaml)	0.2-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前9天停止施藥。
20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid)	0.4-0.8 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前7天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前12天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前12天停止施藥。
75%陶斯松 水分散性粒劑* (Chlorpyrifos)	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前12天停止施藥。
16%可尼丁 水溶性粒劑* (Clothianidin)	0.6-1.3 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前10天停止施藥。
20%達特南 水溶性粒劑* (Dinotefuran)	0.5-1 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前15天停止施藥。
50%撲滅松乳劑* (Fenitrothion)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前10天停止施藥。
50%芬殺松乳劑* (Fenthion)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前6天停止施藥。
50%芬殺松 水基乳劑* (Fenthion)	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前6天停止施藥。
100g/L賜派滅 水懸劑* (Spirotetramat)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 。	採收前10天停止施藥。

*延伸使用藥劑