

四、黃金果果實蠅類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.4%第滅寧水懸劑* (Deltamethrin)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.8%第滅寧乳劑* (Deltamethrin)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
2.8%第滅寧水基乳劑* (Deltamethrin)	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40%撲滅松可濕性粉劑* (Fenitrothion)	0.53公斤	150	使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每7天1次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	
50%芬殺松乳劑* (Fenthion)	0.9-2 公升	1,000	果實6~7分熟時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%芬殺松水基乳劑* (Fenthion)	0.9-2 公升	1,000	果實6~7分熟時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%馬拉松可濕性粉劑* (Malathion)	0.8公斤	100	使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每7天1次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	

*延伸使用藥劑