

### 三、番荔枝炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500g/L三氟派瑞水懸劑* (Fluopyram + Trifloxystrobin)	0.2-0.5 公升	4,000	謝花幼果期開始施藥，必要時隔14天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
325g/L亞托待克利水懸劑* (Azoxystrobin + Difenconazole)		3,000	開花初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次；接著每隔14天施藥一次，至套袋為止。	採收前21天停止施藥。
50%撲克拉錳可濕性粉劑* (Prochloraz-manganese)	0.1-0.3 公斤	6,000	開花初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑* (Mancozeb)	1.8-3.8 公斤	400	開花初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
70%甲基多保淨可濕性粉劑* (Thiophanate-methyl)	0.7-1.5 公斤	1,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%甲基多保淨水懸劑* (Thiophanate-methyl)	1.4-3 公升	500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	0.2-0.5 公升	3,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑* (Iminoctadine tris(albesilate))	0.5-1 公斤	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
25.9%得克利水基乳劑* (Tebuconazole)	0.5-1 公升	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
80%免得爛水分散性粒劑* (Metiram)	1.4-3 公斤	500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%三氟敏水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
62.5%賽普護汰寧 水分散性粒劑* (Cyprodinil + Fludioxonil)	0.4-0.8 公斤	2,000	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
10%亞托敏 水懸劑* (Azoxystrobin)	1-2公升	800	開花初期施藥，必要時 隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期施藥，必要時 隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

TACTRI