

三、蘋果炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	1.25-1.5 公升	800	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%亞托敏 水分散性粒劑* (Azoxystrobin)	0.25-0.3 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
39.5%扶吉胺 水懸劑* (Fluazinam)	0.5-0.6 公升	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-0.6 公升	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
23.7%依普同 水懸劑* (Iprodione)	1.1-1.5 公升	800	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
70%甲基多保淨 可濕性粉劑* (Thiophanate-methyl)	0.9-1.2 公斤	1,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
40%甲基多保淨 水懸劑* (Thiophanate-methyl)	1.8-2.4 公升	500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
40%克熱淨 (烷苯磺酸鹽) 可濕性粉劑* (Iminoctadine tris (albesilate))	0.6-0.8 公斤	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.可能引起蘋果表面發生鏽斑。
25.9%得克利 水基乳劑* (Tebuconazole)	0.6-0.8 公升	1,500	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
50%三氟敏 水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.3 公斤	4,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
50%克收欣 水分散性粒劑* (Kresoxim-methyl)	0.5-0.6 公斤	2,000	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑