

八、蘋果蚜蟲類

學名：*Aphis pomi* De Geer

英名：Green apple aphid, Apple aphid

生活習性：雌成蟲體為黃綠色，成蟲及若蟲多寄生於幼嫩枝條新芽及心葉上為害。

危害特徵：被害新芽生育受阻，心葉皺縮，致使植株生長不良。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%滅多松乳劑 (Oxydemeton-methyl)		1,000	發現嫩枝條有蚜蟲時，每隔10天施藥一次。	1.僅噴施蚜蟲為害枝。 2.採收前30天停止施藥。
10%氟尼胺 水分散性粒劑* (Flonicamid)	0.3-0.4 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
30%裕必松 可濕性粉劑* (Phosalone)	0.9-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天施藥一次。	1.採收前15天停止施藥。 2.可能引起某些品種蘋果發生藥害。

*延伸使用藥劑