

十三、蘋果捲葉蛾類、螟蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	1-1.3 公斤	900	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-0.7 公升	1,800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.5-0.7 公斤	1,800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
22.5%陶斯松 乳劑* (Chlorpyrifos)	1.1-1.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
40.8%陶斯松 乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
44.9%陶斯松 乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-0.8 公斤	1,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。

*延伸使用藥劑