

## 十四、蘋果梨瘤蚜

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%滅必蝨乳劑* (Isoprocarb)	1.1-1.5 公升	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%滅必蝨可濕性粉劑* (Isoprocarb)	0.5-0.6 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
25%陶斯松可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	1.8-2.4 公斤	500	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
50%陶斯松水基乳劑* (Chlorpyrifos)	0.9-1.2 公升	1,000	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
50%陶斯松可濕性粉劑* (Chlorpyrifos)	0.9-1.2 公斤	1,000	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	2-2.7 公升	450	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	1.1-1.5 公升	800	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	1-1.3 公升	900	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。
40.8%陶斯松水基乳劑* (Chlorpyrifos)	1.1-1.5 公升	800	害蟲發生時施藥一次，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前10天停止施藥。 2.避免與銅劑混合使用，以免發生藥害。 3.避免於果實肥大期施用，以免發生藥斑。

\*延伸使用藥劑

