

五、酪梨薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%陶斯松 水基乳劑 (Chlorpyrifos)	0.8-1.0 公升	2,000	害蟲發生時施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對水生物劇毒。
50%陶斯松 可濕性粉劑 (Chlorpyrifos)	0.8-1.0 公斤	2,000	害蟲發生時施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對水生物劇毒。
2.5%賽洛寧 微乳劑 (lambda-cyhalothrin)	0.7-1.0 公升	2,000	害蟲發生時施藥一次。	採收前6天停止施藥。
18.2%益達胺 水懸劑* (Imidacloprid)	0.75-1.0 公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
37%第滅達胺 水懸劑* (Deltamethrin + Imidacloprid)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.4-0.7 公升	3,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
5.87%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.7-1.3 公升	1,600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑